

附件

麻疹的潛伏期(即由感染後到發病的時間)為七至 21 日。市民於下列時段曾到相關公眾地點，於七至 21 日(即醫學監察期)內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點：

	日期	時間	地點	接觸者醫學監察截止日期
男／25 歲	三月三十一日	17:45-00:00	香港國際機場一號客運大樓第七層	四月二十一日
	四月一日	00:00-06:50 20:00-00:00	香港國際機場一號客運大樓第七層	四月二十二日
	四月二日	00:00-08:30 17:45-00:00	香港國際機場一號客運大樓第七層	四月二十三日
	四月三日	00:00-07:05	香港國際機場一號客運大樓第七層	四月二十四日
	四月五日	17:45-19:00	香港國際機場一號客運大樓第七層	四月二十六日
		19:36-20:55	萊佛士醫療中心 香港國際機場一號客運大樓第六層 6T-104	四月二十六日
		21:34-21:49	北大嶼山醫院急症室	四月二十六日