附件

麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為七至 21 日。市民於下列時段曾到相關公眾地點，於七至 21 日（即醫學監察期）內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點：

	日期	時間	地點	接觸者醫學監察 截止日期
男／30 歲	四月一日	11:00 – 22:00	香港國際機場二號客運大樓第五層	四月二十二日
	四月二日	12:00 – 22:00	香港國際機場二號客運大樓第五層	四月二十三日
	四月三日	11:00 – 22:00	香港國際機場二號客運大樓第五層	四月二十四日
	四月四日	12:00 – 14:00	香港國際機場二號客運大樓第五層	四月二十五日
		15:00 – 16:30	盈健醫務中心 港鐵東涌站 20 號舖	
	四月五日	11:30 – 22:00	香港國際機場二號客運大樓第五層	四月二十六日