

## 附件

麻疹的潛伏期(即由感染後到發病的時間)為七至 21 日。市民於下列時段曾到相關公眾地點，於七至 21 日(即醫學監察期)內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點：

	日期	時間	地點	接觸者醫學監察截止日期
男/30 歲	五月七日	約 09:15	U0848 航班由香港前往東京	五月二十八日
	五月十一日	約 01:00	U033 航班由東京回香港	六月一日
	五月十一日	13:52-13:57	廣華醫院急症室	六月一日
女/25 歲	五月七日	09:30-19:00	尖沙咀廣東道 11 號 海港城 G124-125A 及 G220 號	五月二十八日
	五月八日	11:00-22:30	尖沙咀廣東道 11 號 海港城 G124-125A 及 G220 號	五月二十九日
	五月十一日	13:50-13:55	廣華醫院急症室	六月一日
女/25 歲	五月六日	09:30-19:00	尖沙咀廣東道 11 號 海港城 G124-125A 及 G220 號	五月二十七日
	五月八日	09:30-19:00	尖沙咀廣東道 11 號 海港城 G124-125A 及 G220 號	五月二十九日
	五月九日	13:00-22:30	尖沙咀廣東道 11 號 海港城 G124-125A 及 G220 號	五月三十日
	五月十一日	01:07-01:12	將軍澳醫院急症室	六月一日