

附件

麻疹的潛伏期(即由感染後到發病的時間)為七至 21 日。市民於下列時段曾到相關公眾地點，於七至 21 日(即醫學監察期)內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診。如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，他們亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點：

	日期	時間	地點	接觸者醫學監察截止日期
男／33 歲	五月三十一日	11:15-12:15	盈健醫務中心 (油塘) 油塘鯉魚門廣場 1 樓 131 號鋪	六月二十一日
	六月三日	16:30-18:15	盈健醫務中心 (油塘) 油塘鯉魚門廣場 1 樓 131 號鋪	六月二十四日
		18:40-00:00	基督教聯合醫院急症室	
	六月四日	00:00-01:26	基督教聯合醫院急症室	六月二十五日