

附件

麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為七至 21 日。市民於下列時段曾到相關公眾地點，於七至 21 日（即醫學監察期）內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診。如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，他們亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點：

	日期	時間	地點	接觸者醫學監察截止日期
男／35 歲	七月五日	22:15 – 23:25	香港浸信會醫院	七月二十六日
	七月七日	12:05 – 13:45	香港浸信會醫院	七月二十八日
	七月八日	13:00 – 13:15	曾祈殷醫生醫務所 旺角彌敦道 639 號雅蘭中心辦公樓一期九樓 927 室	七月二十九日