

附件

麻疹的潛伏期（即由感染後到發病的時間）為七至 21 日。市民於下列時段曾到相關公眾地點，於七至 21 日（即醫學監察期）內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診。如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，他們亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點：

	日期	時間	地點	接觸者醫學監察截止日期
男／30 歲	十月一日	06:20 – 08:00	落馬洲支線管制站	十月二十二日
		08:00 – 13:30	羅湖管制站	
		13:30 – 14:30	落馬洲支線管制站	
	十月二日	14:30 – 15:30	落馬洲支線管制站	十月二十三日
		15:30 – 17:30	羅湖管制站	
		17:30 – 22:45	落馬洲支線管制站	
	十月四日	06:20 – 08:00	落馬洲支線管制站	十月二十五日
		08:00 – 13:30	羅湖管制站	
		13:30 – 14:30	落馬洲支線管制站	
	十月五日	09:00 – 09:30	油麻地賽馬會普通科門診診所	十月二十六日