

附件：中成藥說明書指引節錄

情況	須於【該成藥的禁忌】項下 標示的字句或提示
含何首烏的中成藥	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 肝腎功能不全者禁用。</li><li>2. 孕婦禁用。</li><li>3. 已知有本品或組方藥物肝損傷個人史的患者不宜使用。</li></ol>

情況	須於【使用該成藥時須採取的預防措施】項下 標示的字句或提示
含何首烏的中成藥	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 服藥期間應注意監測肝生化指標，如發現肝生化指標異常或出現全身乏力、食慾不振、厭油、噁心、尿黃、目黃、皮膚黃染等可能與肝損傷有關的臨床表現時，或原有肝生化檢查異常、肝損傷臨床症狀加重時，應立即停藥並就醫。</li><li>2. 嚴格按用法用量服用，不超劑量、長期連續服用。</li><li>3. 老年人及肝生化指標異常、有肝病者慎用。</li><li>4. 哺乳婦女服藥期間應選擇停止哺乳或停止使用本品。</li><li>5. 目前尚無系統的兒童用藥安全性研究資料，兒童應慎用。</li><li>6. 已知有本品或其組方藥物肝損傷家族史的患者慎用。</li><li>7. 應避免與其他有肝毒性的藥物聯合使用。</li></ol>