

附件

麻疹的潛伏期(即由感染後到發病的時間)為七至 21 日。市民於下列時段曾到相關公眾地點，於七至 21 日(即醫學監察期)內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診。如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，他們亦應在到訪前預先告知醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施，防止可能出現的傳播。

麻疹個案病人病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點：

	日期	時間	地點	接觸者醫學監察截止日期
男/32 歲	五月二十一日	14:15 - 23:15	尖沙咀廣東道 7-25 號海港城 G126 號店	六月十一日
	五月二十三日	12:00 - 21:00	尖沙咀廣東道 7-25 號海港城 G126 號店	六月十三日
	五月二十四日	14:15 - 23:15	尖沙咀廣東道 7-25 號海港城 G126 號店	六月十四日
	五月二十五日	14:15 - 23:15	尖沙咀廣東道 7-25 號海港城 G126 號店	六月十五日
	五月二十六日	12:30 - 13:00	卓健醫療中心 青衣青敬路 33 號青衣城 1 期 3 樓 308D 號舖	六月十六日